

ರಾಗಿ – ಖುಷ್ಕಿ

(ದಕ್ಷಿಣ ಒಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶ, ಮಲೆನಾಡು ಮತ್ತು ಅರೆ ಮಲೆನಾಡು)



ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಗಿಯು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಖುಷ್ಕಿ ಬೇಳೆ.

ತಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲ

ತಳೆಗಳು	ಅವಧಿ (ದಿನಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಿತ್ತನೆ ಕಾಲ
1. ಇಂಡಾಫ್ರೋ-8	120–130	ಜೂನ್‌–ಜುಲೈ
2. ಎಂ.ಆರ್-1	120–125	
3. ಇಂಡಾಫ್ರೋ-5	105–110	ಜುಲೈ–ಆಗಸ್ಟ್
4. ಪಿ.ಆರ್-202	115–120	ಆಗಸ್ಟ್
5. ಇಂಡಾಫ್ರೋ-9	105–115	ಆಗಸ್ಟ್–ಅಕ್ಟೋಬರ್
6. ಹೆಚ್.ಆರ್-911	115–120	ಜುಲೈ
7. ಜಿ.ಪಿ.ಯು-28	110–115	ಜುಲೈ–ಆಗಸ್ಟ್
8. ಎಂ.ಆರ್-2	125–130	ಜೂನ್‌–ಜುಲೈ (ವಲಯ-7)
9. ಎಲ್-5	115–120	ಜೂನ್‌–ಜುಲೈ

*ಇಲುಕು ಹಾಗೂ ಕುತ್ತಿಗೆ ಬೆಂಕೆ ರೋಗ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯಿರುತ್ತದೆ (ಸೂಕ್ತವಾದ ವಲಯಗಳು 4, 5, 6 ಮತ್ತು 7)

ಬೇಸಾಯಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮರ್ಗಳು (ಹೆಚ್‌ರೋಗೆ)

ಬೀಜ:	
ಕೂರಿಗೆ ಬಿತ್ತನೆಗೆ	10-12 ಕೆ.ಜಿ
ನಾಟೆ ಬೇಳೆಗೆ	5 ಕೆ.ಜಿ
ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್	7.5 ಟನ್
ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು:	
ಸಾರಜನಕ	50 ಕೆ.ಜಿ
ರಂಜಕ	40 ಕೆ.ಜಿ
ಮೊಟ್ಟುಷ್ಟು	25 ಕೆ.ಜಿ

ಸೂಚನೆ: ಮಣಿನ ಪರಿಷ್ಕೆಯ ಫಲಿತಾಂಶದ ಅಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ.

ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಹದ ಮಾಡುವುದು: ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿ.ಬಿತ್ತನೆ ರಾಗಿಯನ್ನು 600 ಮಿ.ಲೀ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 18 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿ (ಸಾಯಂಕಾಲದಿಂದ ಮಾರನೆಯ ದಿನ ಬೆಳಗಿನ ವರೆಗೆ ನೆನೆಸುವುದರಿಮದ ಮೊದಲ ಮೊಳೆಯ ಲ್ಕಣಾಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು). ಅನಂತರ ಬಿತ್ತನೆಯನ್ನು 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಒಳಗಿಸಿ, 12.5 ಗ್ರಾಂ ಸತುವಿನ ಸೆಲ್ಫೆಟ್‌ನ್ನು 5-6 ಚೆಮ್ಚ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ತಯಾರಿಸಿದ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಒಂದು ಮಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಪಳ್ಳಿಸ್ಕೋ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಇದಕ್ಕೆ 2 ರಿಮದ 2.5 ಕೆ.ಜಿ ಬೀಜವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಇಡಿ. ನಂತರ ಶಿಲೀಂದ್ರನಾಶಕದಿಂದ ಬೀಜೋವಚಾರ ಮಾಡಿ.

ಬಿತ್ತನೆ



ಬೀಜವನ್ನು 30 ಸೆ.ಮೀ ಅಂತರದ ಸಂಯುಕ್ತ ಕೂರಿಗೆಯಿಂದ ನಾಟಿ ಮಾಡುವುದಾದಲ್ಲಿ 30 ಸೆ.ಮೀ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ 10 ಸೆ.ಮೀ ಅಂತರದಲ್ಲಿ 2-3 ಪೈರಿನಂತೆ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ. ಬಿತ್ತನೆ ಅಥವಾ ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಧಭಾಗ ಸಾರಜನಕ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಿ ರಂಜಕ ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟುಷ್ಟು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಕೋಡಿ 6 ರಿಂದ 7 ವಾರಗಳ ನಂತರ ಉಳಿದ ಅಧಭಾಗ ಸಾರಜನಕ ಒದಗಿಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಕೋಡಿ.

ಅನಿವಾರ್ಯಕರಣಗಳೀಂದ ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡಲಾಗದೆ ಇದ್ದು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಷ್ಟತರ ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಕೊಡುವುದಾದರೆ ಶಿಥಾರನ್ನು ಮಾಡಿದ ಅಥವ ಭಾಗ ಅಂದರೆ 25 ಕೆ.ಜಿ ಸಾರಜನಕ, 18 ಕೆ.ಜಿ ರಂಜಕ ಮತ್ತು 12 ಕೆ.ಜಿ ಮೋಟಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಿರೆ ಸಾಕು.

ಉಳಿದ ಸಾಗುವಳಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀರಾವರಿ ಬೆಳಗೆ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆಯೇ ಅನುಸರಿಸಿ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸನ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ

ಬಿತ್ತಿದ ದಿವಸ ಅಥವಾ ಮಾರನೆಯ ದಿವಸ ಹೆಚ್ಚೆರಿಗೆ 750 ಗ್ರಾಂ ಯನ್ನೋಮ್ಲೋಟುರಾನ್ ಶೇ.75ರ ಪುಡಿಯನ್ನು 750 ಲೀ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿ, ಸಿಂಪರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತೇವಾಂಶವಿರಲಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಂಟಿಗಳಿರದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ. ಸಿಂಪರಣೆಯ ನಂತರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತುಳಿಯಬೇಕು. ಬೀಜದಿಂದ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಕಳೆಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಟ್ಟೊಳಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ಇಳುವರಿ

ಹೆಚ್ಚೆರಿಗೆ ಸುಮಾರು 15–20 ಕ್ಷೀಂಟಾಲ್ ಧಾನ್ಯ ಹಾಗೂ 3–4 ಟನ್ ಹುಲ್ಲು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಮುಖ್ಯವಾದ, ಬಂಚು ಇಲ್ಲದ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳು

- ಬಿತ್ತನೆಗೆ 3 ವಾರಗಳ ಮೊದಲೇ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ.
- ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್/ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೆರೆಸಲು ತಡವಾದಲ್ಲಿ ಅದರ ಗುಪ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ಪದರದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಡುವುದು ಲಾಭದಾಯ.
- ಬಿತ್ತನೆಯ ಕಾಲಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ತಳಿಗಳ ಆಯ್ದು ಮಾಡಿ.
- 20–25 ದಿನವರೆಗೆ ಪೈರನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿ.
- ಬುಷ್ಟು ವಾತಾವರಣಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತರ ಬೇಸಾಯ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.